

Sommaire

Généralités	2
Variétés présentées – notes complémentaires	2
Groseilliers à maquereaux.....	2
Groseilliers.....	2
Framboisiers	5
Maladies	5
Pépinières recommandées	5
Framboisiers remontants	5
Framboisiers non-remontants	7
Cassis.....	8
Casseilles	8
Ronces	9
Ronce cultivée.....	9
Ronce du Japon - <i>Rubus phoenicolasius</i>	10

Généralités

Les variétés présentées sont celles qui sont considérées par Edouard Menet comme les plus adaptées à la production, suite aux différents essais qu'il mène depuis 2010. De façon générale, il n'est pas intéressant économiquement de produire ses propres plants ; le choix du fournisseur de plants est dès lors fondamental, et il faut à tout prix éviter les plants bradés, car ils ne comportent aucune garantie quant à leur origine ou variété.

Variétés présentées – notes complémentaires

Groseilliers à maquereaux

- Variétés
 - Les variétés rouges (Hinnonmaki et Freedomia (sans épines)) sont les plus sucrées

Groseilliers

- Les variétés :
 - Les variétés sont adaptées à l'ombre (espèce d'origine forestière !), mais plus il y a de lumière, plus les fruits sont sucrés
 - Retour aux variétés anciennes
 - Préférer les variétés tardives, qui ont de plus belles grappes, plus faciles à couper, qui présentent mieux à la vente, et qui simplement, sont meilleures (les fruits reçoivent plus de soleil)
- Fruits
 - Une fois à maturité, les groseilles se conservent bien sur la plante, il n'est pas nécessaire de passer récolter régulièrement ; cependant une fois à maturité, le taux de sucre n'augmente plus.
- Plantation
 - De fin octobre à mi février au plus tard !
 - La plantation automnale permet à la plante de continuer à produire des racines et des bourgeons
 - Lors d'une plantation tardive, la plante s'épuise au printemps à produire des racines ET à se développer
 - Ajouter de la potasse minérale dans le trou de plantation
 - La vinasse de betterave est un produit bon marché : +/- 180 € / tonne
- Productivité
 - Environ 4 Kg par mètre linéaire
 - Pas de production la première année car il est recommandé d'arracher les fleurs au printemps pour renforcer l'installation de la plante
- Croissance
 - Les groseilliers font leur nouveau rameaux sur base des réserves de l'année précédente
 - Les pousses de groseilliers sont finies fin mai
- Prix de vente
 - Marché de gros :
 - 8 €/Kg au début de juin (les premières groseilles sont attendues)
 - 2 €/Kg fin juillet, les imports (Pologne ...) cassant les prix
 - Vente directe :
 - 6 €/Kg

- Taille
 - De façon générale, il faut monter la plante, en taillant tous les rameaux qui sont en dessous de 40 cm ; en effet, chargés de fruits, ces rameaux (souples) se plient rapidement et les fruits se retrouvent sur le sol
 - Favoriser les rameaux vigoureux, couper les branches avec pousse annuelle petite ou nulle
 - Ne JAMAIS tailler les groseilliers à l'horizontale, les bourgeons floraux (qui donneront les fruits) étant au sommet des rameaux
- Maladies – ravageurs
 - Pucerons :
 - ne pas traiter, les coccinelles se chargeront du problème
 - Oïdium :
 - Au printemps, sur nouvelles pousses / feuilles
 - Traitement à la bouillie bordelaise si nécessaire
 - Tenthrede
 - Hyménoptère dont la larve dévore les feuilles
 - Traitement : Spinosad (molécule) → vérifier son autorisation en Agriculture Bio
 - Anthracnose
 - Provoque la chute prématurée des feuilles fin juillet, ce qui a pour effet, une diminution de la photosynthèse, et un affaiblissement de la plante



Pousse annuelle vigoureuse, à conserver



Taille propre et nette d'une branche de 2 ans



Framboisiers

Maladies

- Diptère (mouche) : *Drosophila suzukii*
 - ses larves s'attaquent à tous les fruits, sauf groseilles, et surtout aux framboises
 - Jusqu'à 50 % de pertes sur fruits
 - Lutte : piège à phéromones, et vinaigre de cidre de pommes
 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Drosophila_suzukii



Pépinières recommandées

- PEPIMAT : <http://pepimat.com/>
- DEGRAV-AGRI : <http://www.degrav-agri.fr/>

Framboisiers remontants

- Fruits
 - Donnent des fruits sur les cannes de l'année même
 - Récolte de début août jusqu'aux premières gelées
 - Fruits plus fragiles que ceux des framboisiers non remontants
- Variétés
 - Bliss (récolte fin juillet – début août)
 - Heritage (récolte en septembre)
 - Polka
 - Fallgod (jaune)
 - Autres : autumn treasure, AlpenGold
- Culture
 - Sous serres, car production plus tardive et fruits plus sensibles
 - Cannes coupées à ras du sol en janvier - février
 - Types de plants :
 - Plants RN : 60 – 70 % de reprise
 - prix HTVA: à partir de 0,66 € mais préférer des plants autour de 1 € /plant
 - Mottes (aussi en bio) : +/- 100 % de reprise
 - Prix HTVA : 1,46 €/plant
- Plantation
 - En haie
 - Trois plants par mètre linéaire
 - Limiter le nombre de tiges à 10 par mètre linéaire
 - Arrachez les plants excédentaires (donc avec leurs racines) en mai, ainsi que les plants les plus frêles
 - Dans une bâche ou toile tissée pour limiter le nombre de drageons
- Productivité
 - 3 Kg / mètre linéaire, prix de vente : 16 € / Kg aux GASAP



Framboisiers non-remontants

- Fruits
 - Donnent des fruits sur les tiges de l'année précédente
 - Récolte entre fin juin et fin juillet, tout est généralement récolté en 2 semaines
 - Passages fréquents (idéalement tous les 2 jours) pour la récolte
- Productivité
 - La pleine production est atteinte la 3^e année
 - 3 Kg / mètre linéaire, prix de vente : 16 € / Kg aux GASAP
- Variétés
 - Meeker
 - Tulameen
 - Mailing promise
- Culture
 - En extérieur
 - Fruits plus résistants que ceux des framboisiers remontants
 - Palisser sur un seul plan
 - Taille à 1,80 m
 - 3 plants par mètre linéaire
 - Garder 10 tiges / mètre
 - Préférer les plants en motte, car en RN on ne voit pas toujours les bourgeons et on ne sait pas si le plant est viable
- Taille
 - La première année : on recoupe les tiges à 5 cm pour renforcer les plants





Cassis

- Plants
 - On ne gagne rien en achetant des plants en pots, ceux à RN sont recommandés
- Taille
 - Une taille vigoureuse augmente le taux de sucre des fruits
- Fruits
 - Il est préférable de choisir des variétés destinées à la transformation (Wellington xxx, et Andega), débouché le plus rentable
 - Aux environs du 10 juillet, tout récolter en quelques jours

Casseilles

- Fruits :
 - Meilleure production sur rameaux de 2 ans, mais ceux ci se courbent, tombent au sol, ce qui ralentit la récolte
 - JOSTA : fruits fin juillet, tout récolter en une semaine maximum

Ronces

Ronce cultivée

- Plantation
 - Plants espacés de 2 mètres
 - 35 à 40 cm entre les tiges
- Variétés
 - Majorité des variétés sans épine
 - Hâtives :
 - Lochness
 - Lochtray
 - Tardives
 - Thornless Evergreen
 - Variétés sauvages
- Culture
 - Tiges bisannuelles
 - Ne remonte généralement pas
 - Couper à la base les tiges ayant produit, en automne
- Fruits
 - Production sur tiges de l'année précédente (non remontant généralement)



Ronce du Japon - *Rubus phoenicolasius*

- Production complète en semaines, en 3-4 récoltes
- Intéressant car tout mûrit en même temps, mais fruits avec peu de goût

